



TASNİF DIŞI

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı : 54398317-510.01.10-E.76119

10.05.2019

Konu : Xeljanz SSMMM TEB

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  
Willy Brandt Sokak No:9 06690  
ÇANKAYA/ANKARA

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulaması Kurumumuzca yürütülmektedir. Bu doğrultuda, "Xeljanz (tofasitinib) için Türkiye'de onaylı olmayan dozda kullanım sonucu pulmoner emboli ve tüm nedenlere bağlı ölüm sıklığında artış görülmesi hakkında yeni güvenlik bilgisi" başlığıyla dağıtılmıştır. Kurumumuzca onaylanan ekte yer alan doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sitenizin ana sayfasında duyurularak üyelerinize ulaştırılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU  
Kurum Başkanı a.  
Daire Başkanı

Ek : Mektup (2 sayfa)

Söğütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA  
Tel: (0 312) 218 30 00 - Fax : (0 312) 218 34 60

Bilgi İçin: Gülru GÜRDEMİR  
Unvan: Eczacı  
Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman <http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol> adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza ası ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : SHY3Q3NRQ3NRRG83M0FyS3k0S3k0

TASNİF DIŞI



**Pfizer PFE Türkiye**  
Pfizer PFE İlaçları A.Ş.  
Muallim Naci Cad. No:55  
Ortaköy 34347 İstanbul/Türkiye

02.05.2019

**▼ XELJANZ(TOFASİTİNİB) İÇİN TÜRKİYE'DE ONAYLI OLMAYAN DOZDA KULLANIM SONUCU PULMONER EMBOLİ VE TÜM NEDENLERE BAĞLI ÖLÜM SIKLIĞINDA ARTIS GÖRÜLMESİ HAKKINDA YENİ GÜVENLİLIK BİLGİSİ**

**Sayın Doktor,**

Bu mektubun amacı, XELJANZ (tofasitinib) adlı ilaçın 2x10 mg dozda (*Türkiye'de ilgili doz onaylı değildir*) pulmoner emboli ve tüm nedenlere bağlı ölüm görülme sıklığı ile ilgili ortaya çıkan yeni güvenililik bilgisini sizinle paylaşmaktadır.

Bu mektup, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; ruhsat sahipleri ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Bu mektuba <https://www.titck.gov.tr> adresinden de ulaşabilirsiniz.

**Güvenlilik bilgisi hakkında ayrıntılı açıklama**

- Pfizer, 19 Şubat 2019 tarihinde, Amerikan İlaç Dairesi (FDA)'nın pazarlama sonrası yapılmasını gereklî gördüğü A3921133 kodlu romatoid artrit (RA) çalışmasında günde 2 kez 10 mg tofasitinib kullanan hastaların dozumun günde 2 kez 5 mg tofasitinib olacak şekilde revize edileceğini duyurmuştur. Bu değişiklik, Romatoloji Veri Güveniligi İzleme Kurulu (DSMB)'nın günde 2 kez tofasitinib 10 mg alan hastalarda, TNF inhibitörü alan hasta grubuna göre pulmoner emboli ve tüm nedenlere bağlı ölüm görülme sıklığında artış tespit etmesi üzerine yayınladığı bildiri nedeniyle yapılmıştır.
- Bu RA çalışması, kardiyovasküler olay riskini belirlemek için tasarlandığından önceki tofasitinib çalışmalarının aksine, hastaların 50 yaş üzerinde ve en az bir kardiyovasküler risk faktörüne sahip olmasını şart koşmuştur. Tüm hastalar çalışmaya arka planda sabit metotreksat tedavisiyle girmiştir. A3921133 çalışmasındaki benzer sonuçlar, FDA'nın Advers Olay Raporlama Sistemi (FAERS) veri tabanının istatistiksel analizi de dâhil olmak üzere, Pfizer'in diğer tofasitinib RA klinik çalışmalarındaki analizlerinde ya da pazarlama sonrası güvenlik verilerinin rutin izleminde tespit edilmemiştir.
- ABD'de günde 2 kez 10 mg tofasitinib kullanımı, sadece orta ve şiddetli ülseratif koliti olan yetişkin hastaların tedavisinde onaylıdır. Türkiye'de tofasitinibin günde 2 kez 10 mg dozu herhangi bir endikasyon için onaylı değildir.

Sağlık mesleği mensupları, tedavi ettikleri durumlar için tofasitinib ürün bilgisindeki önerileri takip etmelidir. Hastalar, pulmoner emboli bulgu ve belirtileri için izlenmeli ve hastalara ilgili belirtileri kendilerinde görmeleri halinde acilen tıbbi yardım almalarını tavsiye edilmelidir.

Bu mektubun amacı, bahsi geçen RA çalışmasında günde 2 kez 10 mg doz alan grupta ortaya çıkan bu verinin farkında olmanızı ve bu durumu hastalarınıza Xeljanz kullanımını ile ilgili bilgi verirken göz önünde bulundurmanızı sağlamaktır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Dokuman <http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/Elmza/Kontrol> adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokumanın doğrulama kodu : 1YnUyQ3NRZmxXYnUyS3kOZ1AxM0Fy

1/2

Ticaret Sicil No: 952769  
Mersis No: 0729056129600018

[www.pfizer.com.tr](http://www.pfizer.com.tr)


### Bildirim gerekliliği

İlaç ruhsatlandırıldıktan sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak takip edilmesine imkân tanımaktadır. Sağlık mesleği mensuplarının her türlü şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ni (TÜFAM) ([www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr); e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99) bilgilendirmenizi hatırlatırız.

Ayrıca advers reaksiyonlar, hastanenizde görevli "Farmakovijilans İrtibat Noktası" aracılığıyla da bildirilebilir.

Saygılarımla,

Dr. Egemen ÖZBİLGİLİ  
Medikal Direktör  
Pfizer PFI İlaçları A.Ş.



Ecz. Sultan Elif Dinçel  
Ülke Ürün Güvenliği Lideri  
Pfizer PFI İlaçları A.Ş.



▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.